

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

(R)

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

Direction Régionale de l'Agriculture
 SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
 Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
 LUCCIANA - 20290 BORGIO -

☎ (95) 36.05.70




Edition Corse

Bulletin Technique n° 74
 du 1^{er} Avril

Pêchers : Poursuivre la protection anti-cloque
 Surveiller ou intervenir contre les
 Pucerons
Nectarines : Attention aux **THRIPS**
Abricotiers : Renouveler le traitement anti-monilia
Fraisiers : Protection contre les pucerons acariens

ATTENTION AUX ABEILLES ET AUX INSECTES POLLINISATEURS



ARBORICULTURE : Pêchers

*** **Cloque** : Cette maladie qui déforme les feuilles et les fait chuter est apparue sur toutes les jeunes feuilles de certains vergers. Ne pas oublier que la protection doit-être assurée jusqu'à l'étalement des feuilles.

Pour les produits se rapporter au bulletin n° 71

*** **Pucerons** : Présence de pucerons **Bruns**, à surveiller de près ou intervenir en cas de besoin avec des aphicides spécifiques tels que :

Pirimicarbe	(PIRIMOR)
Omethoate	(FOLIMATE)
Phosphamidon	(DIMECRON)
Vamidothion	(KILVAL SEPAPHID)

.../...

P 38

NECTARINES :

*** **Thrips** : Au stade G et H dès la nouaison, les larves de ce petit insecte très fragile piquent le tout jeune fruit. Les piqûres provoquent la rugosité de l'épiderme qui se craquelle au cours de sa croissance.



Thrips
adulte



Chute des pétales
Les pétales tombent, les étamines s'exposent, la fécondation a eu lieu.

... Intervenir dans les vergers, ayant subi les attaques de ce parasite l'an passé avec les produits suivants :

- phosalane = AZOFENE SOLONE : non danger. pour abeilles
- metamidophos = TARARON ORTHOTOX : dangereux "
- acephate = ORTHENE

Traiter en dehors des heures de pollinisation

ABRICOTIERS

*** **Monilia** : Renouveler le traitement avec les spécialités suivantes : gr. M. A. /hl



Chute des pétales

- Benomyl = 30 g BENLATE
- carbendazyme = 30 g : nombreuses spécialités
- Triforine = 35 g FUNGINEX SAPROL DENARIN, efficace aussi contre oïdium
- Vinchlozoline = 50 g RONILAN
- Thrirame = 200 g : nombreuses spécialités
- Iprodione = 75 g ROVRAL
- Captafol + carbendazine = 80 g + 20 g CERETAL liquide

FRAISIERS

*** a) **Cultures sous abri** : Aérer les tunnels pour éviter la condensation favorisant les maladies.

Renouveler le traitement antibotrytis sur les variétés parvenues aux stades G.H. - alterner les produits :

- | | | | | |
|------------------|--------------|-----------|----------|---------|
| - Dichlofluanide | -125 g MA/hl | EURAPENE | - Délais | 7 jours |
| - Iprodione | 75 g MA/hl | ROVRAL | " | 2 " |
| - vinchlozoline | 100 g MA/hl | RONILAN | " | 3 " |
| - procymidone | 75 g MA/hl | SUNISCLEX | " | 7 " |

Veiller aux attaques des petites limaces sur les premières fraises tournantes. Ne pas déposer les granulés anti-limaces au contact des fruits.

.../...

STADES REPERES DU FRAISIER

P 39



A - REPOS VÉGÉTATIF
feuillage peu fourni
quelques feuilles sèches



B - DÉPART en VÉGÉTATION
apparition de bourgeons
turgescents
feuilles rudimentaires



C - BOUTONS VERTS
appareils bien visibles
parmi les feuilles
rudimentaires



D - BOUTONS BLANCS
appareils bien
détachés
pétales non dépliées



E - DÉBUT de FLORAISON
3 à 5 fleurs
ouvertes
par pied



F - PLEINE FLORAISON
50% de fleurs
ouvertes



G - FIN de FLORAISON
chute des pétales
début de nouaison



H - PREMIERS FRUITS VERTS
bien visibles

***** b) Cultures de plein champ :**

- Le stade F est atteint - intervenir contre le botrytis et la maladie des taches rouges .
- **Pucerons acariens**
- Surveiller la présence de ces parasites sous les feuilles.
Utiliser une loupe ou apporter quelques feuilles à la Protection des Végétaux.
- Intervenir avec des produits spécifiques contre **pucerons**
 - ... phosalone 60 g MA/hl AZOPHENE ZOLONE
 - ... pyrimicarbe 37,5 MA/hl PIRIMOR



G - FIN DE FLORAISON
chute des pétales
début de nouaison



H - PREMIERS FRUITS VERTS
bien visibles

***** Contre les acariens :**

G. FELICI

- DICOFOL : nombreuses spécialités
- CYHEXATIN " "
- DICOFOL + TRÉ TRADIFON : nombreuses spécialités
- CHINOME THIONATE = morestan à 50 g MA/hl

CULTURES MARAICHERES (sous abris)

- Rappel de traitement contre Aleurode et puceron - se reporter au bulletin n° 73

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

(C) : SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX 1986 - Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation .